

# Il tipo d'intervento necessario dipende dalla gravità della situazione

Situazione iniziale			Misure di ripristino	
Pressione delle malerbe	Livello d'infestazione	Cotica erbosa	Lotta indiretta (prevenzione)	Lotta diretta (cura)
	<b>Livello 1</b> Infestazione assente o trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cotica erbosa equilibrata / ricca in graminacee</li> <li>&gt; 30-50% buone graminacee</li> <li>Malerbe assenti o trascurabili</li> <li>Cotica erbosa fitta e portante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuare con la gestione corrente</li> <li>Cure colturali</li> <li>Consentire ogni tanto, la disseminazione delle buone graminacee cespitose</li> <li>Traseminare saltuariamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenere sotto controllo le poche malerbe presenti estirpandole singolarmente</li> <li>Impedire la disseminazione</li> </ul>
	<b>Livello 2</b> Infestazione di media gravità con effetti negativi misurabili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cotica erbosa ricca di <i>altre erbe</i></li> <li>15-30% di buone graminacee</li> <li>Con trifogli e <i>altre erbe</i> foraggiere, manche <i>altre erbe</i> di scarso valore foraggiere e malerbe</li> <li>Cotica erbosa piuttosto lacunosa e poco portante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuare le cause di diffusione delle malerbe</li> <li>Adattare la gestione alle condizioni stagionali</li> <li>Sfalcio pascolo e/o pascolo primaverile precoce</li> <li>Traseminare ripetutamente</li> <li>PT: distruggere la cotica e cambiare coltura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traseminare ripetutamente</li> <li>Lotta meccanica o diserbo chimico <i>pianta per pianta</i> o su singoli focolai</li> <li>Diserbo di superficie con erbicidi selettivi</li> </ul>
	<b>Livello 3</b> Cotica erbosa irrecuperabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cotica degradata</li> <li>&lt; 15% di buone graminacee</li> <li>Diffusa presenza di malerbe</li> <li>Cotica erbosa infeltrita o molto lacunosa (poco portante)</li> <li>Presenza di molti semi di malerbe nel suolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adattare la gestione alle condizioni stagionali (in ottica futura), in modo da assicurare la presenza duratura di una cotica erbosa fitta, portante e soprattutto produttiva</li> </ul>	Distruzione della cotica erbosa e rifacimento del prato/pascolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aratura/fresatura e risemina</li> <li>Diserbo di superficie con erbicidi non selettivi (vietato in agricoltura biologica!) e risemina</li> </ul>

 Graminacee foraggiere

 Leguminose e *altre erbe* foraggiere

 *Altre erbe* di scarso valore foraggiere e malerbe in generale